

Estimados Padres:

Su niño(a) posiblemente fue expuesto(a) a la enfermedad contagiosa que ha sido marcada más abajo. Si su niño(a) tiene alguno de los síntomas mencionados y ha sido diagnosticado con la enfermedad, haga favor de informar a la escuela.

- ❑ **Infecciones de Estreptococo:** Fiebre escarlatina y garganta séptica. Ataque repentino, usualmente de 2 a 5 días después de haber sido expuesto (a). Fiebre, garganta adolorida, las glándulas en el cuello usualmente se dilatan y duelen, un sarpullido fino aparece más frecuentemente en el cuello y en el pecho. La garganta séptica es fiebre escarlatina sin el sarpullido. **Consulte a su proveedor del cuidado de la salud; se requiere tratamiento medico.**
- ❑ **Impetigo:** Las ampollas y costras se ven ocasionalmente alrededor de la boca y la nariz. También pueden encontrarse en cualquier otra parte del cuerpo. El desague de las llagas es contagioso al tocarse. **Consulte a su proveedor del cuidado de la salud; se requiere tratamiento medico. El niño(a) puede asistir a la escuela si está bajo tratamiento y el area puede ser cubierta.**
- ❑ **Tiña:** En el cuerpo: un círculo de llagas rojizas, secas y escamosas. Cuando se presentan en el cuero cabelludo causan una calvicie temporaria en algunas areas que son contagiosas al contacto. **Consulte a su proveedor del cuidado de la salud; se requiere tratamiento medico. El niño(a) puede asistir a la escuela si está bajo tratamiento y el area puede ser cubierta.**
- ❑ **Sarna:** Pequeñas areas levantadas y rojizas usualmente vistas entre los dedos, alrededor de la muñeca y los codos, en las axilas y en la cintura, las cuales causan una comezón intense, especialmente en la noche. Si se rasca, salen ampollas. Las areas son contagiosas si se tocan. **Consulte a su proveedor del cuidado de la salud; se requiere tratamiento medico. El niño(a) puede asistir a la escuela después de que un tratamiento sea aconsejado por el proveedor del cuidado de la salud.**
- ❑ **Oftalmía:** Laceración, dolor, ojo(s) rojizo(s) con un derrame amarillento (al despertar las pestañas amanecen pegadas unas a las otras). Puede ser sequida por una sensibilidad a la luz y ojos hinchados. **Mantenga al niño(a) fuera de las escuela. Consulte a su proveedor del cuidado de la salud.**
- ❑ **Enfermedad del Quinto:** Mejillas rojas (como si hubiera recibido una cachetada) seguido en un término de 1 a 4 días por un sarpullido (con diseños como encaje) por el cuerpo, el cual puede ocurrir de 1 a 3 semanas después de haberse expuesto al sol o al calor. **Consulte a su proveedor del cuidado de la**

salud. Es recomendable que las mujeres embarazadas que posiblemente hayan sido expuestas consulten a su medico.

- **Enfermedad de las manos, de los pies y de la boca (por ejemplo fiebre):** Calentura, sarpullido en las sentaderas y pequeñas vejigas en la boca, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. **El niño(a) no debe asistir a la escuela hasta que los síntomas hayan desaparecido. Consulte a su proveedor del cuidado de la salud.**

- **Viruelas Locas:** Fiebre leve, usualmente entre los 13 a los 17 días después de haber sido expuesto(a). Un cultivo de ampollas acuosas aparecen en el cuerpo, la cara y el cuero cabelludo, las cuales más tarde forman costras. **Mantenga al niño(a) fuera de la escuela por 7 días después que empezó la erupción de ampollas.**